

**В.В. Шаповалова, О.М. Трембовецька, О.О. Чижевська**

## **Перипартальна кардіоміопатія (складні клінічні випадки)**

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», м. Київ

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):22-23; doi 10.15574/PP.2018.73.22

Останнім часом ми все частіше стикаємося з рідкісним захворюванням міокарда, яке виникає тільки під час вагітності, тобто з перипартальною кардіоміопатією. Це — стан специфічний для вагітності, має тяжкий перебіг і в деяких випадках несприятливий прогноз.

**Ключові слова:** перипартальна кардіоміопатія, вагітність, трансплантація.

### **Peripartum cardiomyopathy (complex clinical cases)**

**V.V. Shapovalova, O.M. Trembovetska, O.O. Chyzevska**

SI «M.M. Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery of NAMS of Ukraine», Kyiv, Ukraine

In these days we more often face a rare disease of the myocardium, which occurs only during pregnancy, namely peripartum cardiomyopathy. This specific for pregnancy condition is characterized by a severe course and in some cases unfavorable prognosis.

**Key words:** peripartum cardiomyopathy, pregnancy, transplantation.

### **Перипартальная кардиомиопатия (сложные клинические случаи)**

**В.В. Шаповалова, Е.М. Трембовецкая, Е.А. Чижевская**

ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова НАМН Украины», г. Киев

В последнее время мы все чаще сталкиваемся с редким заболеванием миокарда, которое возникает только во время беременности, то есть с перипартальной кардиомиопатией. Это — состояние специфическое для беременности, характеризуется тяжелым течением и в некоторых случаях имеет неблагоприятный прогноз.

**Ключевые слова:** перипартальная кардиомиопатия, беременность, трансплантация.

**В**ідповідно до отриманого досвіду, наводимо 2 найтяжчі кінічні випадки перипартальної кардіоміопатії (ПКМП) із різними варіантами перебігу.

#### **I випадок**

Хвора Г., 20 років, госпіталізована в реанімаційне відділення ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» (НИІХХ ім. М. Амосова) у тяжкому стані зі скаргами на виражену задишку в стані спокою, набряки нижніх кінцівок, серцебиття, кашель із мокротинням, із попереднім діагнозом ТЕЛА; в терміні вагітності 17–18 тижнів. З анамнезу захворювання відомо, що стан погіршився різко, за тиждень до госпіталізації з'явилися зазначені скарги. До вагітності ніколи не скаржилася з приводу серцево-судинної патології та не обстежувалася.

На момент госпіталізації проведено комплексне обстеження (ЕКГ, ЕхоКГ, МРТ серця, КТ ОГП, загальні та біохімічні аналізи крові). За даними ЕхоКГ: КДІ 153 мл/м<sup>2</sup>, КСІ 116 мл/м<sup>2</sup>, УІ 81 мл/м<sup>2</sup>, ФВ 26%, на атріовен-трикулярних клапанах помірний зворотний тік, тиск у легеневій артерії 50 мм рт. ст. За даними МРТ: МР-ознаки дилатаційної кардіоміопатії. За даними КТ ОГП: у прикореневих відділах білатерально ділянки масивної дифузної інфільтрації, обумовлені інтерстиціальним набряком на тлі серцевої недостатності. У загальному аналізі крові лейкоцитоз зі

зсувом вліво. З урахуванням усіх даних анамнезу та дообстеження встановлено діагноз перипартальної кардіоміопатії.

Незважаючи на інтенсивну терапію, стан хворої прогресивно погіршувався, тому в термін 19 тижнів вагітності пацієнтці виконано кесарів розтин. Однак стан не поліпшився, тому на 3-тю добу після оперативного втручання пацієнтку переведено на систему екстракорпоральної мембральної оксигенації (ЕКМО), на якій хвора знаходилась протягом місяця, за добу з метою профілактики набряку легень виконано закриту септотомію. Протягом усього періоду приєдналася госпітальна двобічна пневмонія (*Klebsiella pneumoniae* обумовлена), яка значно погіршила стан хворої. За даними ЕхоКГ: ФВ знизилася до 14%.

Браховуючи крайній ступінь тяжкості стану хворої та неефективність запропонованого лікування, єдиним методом врятування життя була трансплантація серця. Пацієнтку доставлено шляхом санавіації в госпіталь Індії, де імплантовано за життєвими показаннями LVAD. Однак на 4-ту добу хвора померла.

#### **II випадок**

Хвора О., 27 років, госпіталізована в реанімаційне відділення ДУ «НИІХХ ім. М. Амосова НАМН України» у тяжкому стані зі скаргами на виражену задишку в стані спокою, нудоту, блікання без полегшення, набряки нижніх кінцівок, асцит.

З анамнезу захворювання відомо, що в терміні вагітності 24–25 тижнів виникла задишка при фізичному навантаженні. В терміні 27 тижнів пацієнта перенесла гостру респіраторну вірусну інфекцію, після чого стан хворої різко погіршився — прогресувала задишка, з'явилися периферійні набряки. За даними ЕхоКГ: збільшення лівих відділів серця, КДІ 160 мл/м<sup>2</sup>, ФВ 29%, виражений зворотний тік на мітральному клапані, тиск у легеневій артерії 50 мм рт. ст. Хвору госпіталізовано в ДУ «Інститут ПАГ НАМН України» і зроблено кесарів розтин за життєвими показаннями. У подальшому переведено в НІССХ ім. М. Амосова, встановлено діагноз перипартальної кардіоміопатії. На медикаментозній терапії відмічалася позитивна динаміка, ФВ підвищилася до 36%, ФК по NYHA II, значно зменшилися показники мітральної регургітації, об'єми лівого шлуночка. Через півроку діагностовано дифузний токсичний зоб у стадії декомпенсації, медикаментозно резистентний, який спровокував погіршення стану. За рекомендацією ендокринолога, враховуючи патологію міокарда, пацієнта пройшла курс радійодтерапії, через тиждень стан різко погіршився, з'явилися нудота з багаторазовим блюванням, жовтяниця, асцит.

При госпіталізації в НІССХ ім. М. Амосова додатково діагностовано токсичний гепатит, важкий перебіг, с/п радійодтерапії, тиреоїдит, стадія гіпотиреозу. Проведено комплексне обстеження (ЕКГ, ЕхоКГ, загальні та біохімічні аналізи крові). За даними ЕхоКГ: КДІ 171 мл/м<sup>2</sup>, КСІ 125 мл/м<sup>2</sup>, УІ 46 мл/м<sup>2</sup>, ФВ 27%, на мітральному клапані виражений

зворотний тік, на тристулковому клапані помірний зворотний тиск, тиск у легеневій артерії 60 мм рт. ст. За даними біохімічного аналізу крові: загальний білірубін 41 мкмоль/л, АСТ 321 Од/л, АЛТ 162 Од/л, лужна фосфатаза 253 Од/л.

За час госпіталізації (3 місяці) виконано один сеанс каскадної плазмофільтрації, з введенням левосимендану, пластiku опорними кільцями атріовентрикулярних клапанів, балонну контрапульсацію. Однак стан хворої погіршився, і за життєвими показаннями її направлено на трансплантацію серця в Індію. На момент відправлення були такі дані ЕхоКГ: КДІ 203 мл/м<sup>2</sup>, КСІ 98 мл/м<sup>2</sup>, УІ 105 мл/м<sup>2</sup>, ФВ 12%, на атріовентрикулярних клапанах помірний зворотний тік, тиск у легеневій артерії 60 мм рт. ст.

Через 3 дні після госпіталізації в індійську клініку була зупинка серцевої діяльності з успішною реанімацією, а через 2 дні потому проведено ортопотічну трансплантацію серця (OTC). На даний час хвора (7 місяців після OTC) в задовільному стані, отримує підтримувальну імуносупресивну терапію.

Таким чином, пацієнтки з ПКМП потребують ретельного диференціального підходу при діагностиці та виборі тактики подальшого спостереження й лікування, що дасть змогу отримати позитивний прогноз перебігу вагітності та пологів за умови надання вчасної, адекватної і кваліфікованої медичної допомоги.

У більшості пацієнток робота серця нормалізується протягом декількох місяців після пологів. В іншому разі, в деяких випадках розглядають показання до трансплантації серця.

## ЛІТЕРАТУРА

- Elkayam U et al. (2006, Aug.). Peripartum cardiomyopathy. Lancet. 19; 368(9536): 687–93.
- Sliwa K, Hilfiker-Kleiner D, Petrie MC et al. (2010). Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy

of peripartum cardiomyopathy: a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology Working Group on peripartum cardiomyopathy. Eur J Heart Fail. 12: 767–778.

## Сведения об авторах:

**Шаповалова В.В.** — ГУ «Національний інститут сердечно-сосудистої хірургії імені Н.М. Амосова НАМН України». Адрес: г.Киев, ул. Амосова, 6; тел. (044) 275-64-00.  
**Трембовецька О.М.** — ГУ «Національний інститут сердечно-сосудистої хірургії імені Н.М. Амосова НАМН України». Адрес: г.Киев, ул. Амосова, 6; тел. (044) 275-64-00.  
**Чижевська О.О.** — ГУ «Національний інститут сердечно-сосудистої хірургії імені Н.М. Амосова НАМН України». Адрес: г.Киев, ул. Амосова, 6; тел. (044) 275-64-00.

Стаття поступила в редакцію 12.09.2017 г.