

УДК: 616.1:616.44

Синдром гипотиреоза как фактор риска возникновения нарушений парасимпатической иннервации

Алиева Гюнай Ильхам кызы

Азербайджанский медицинский университет, г. Баку

Цель исследования: изучение синдрома гипотиреоза как фактора риска развития автономной нейропатии (АН).

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 77 женщин, из которых у 31 диагностирован синдром гипотиреоза, а у 46 – эутиреоидная патология щитовидной железы (ЩЖ). Возраст больных с синдромом гипотиреоза находился в диапазоне от 24 до 57 лет и в среднем был равен $42,4 \pm 9,20$ года; средний возраст больных группы эутиреоидной патологии ЩЖ был равен $40,0 \pm 12,22$ года (возрастной интервал 20–63 года). Больным проводили ультразвуковое обследование ЩЖ, определяли уровень гликемии натощак, уровень А1с, ТТГ, Т4с, Т3с, содержание креатинина в крови, а также вычисление СКФ по уравнениям CKD-EPI on line. Помимо этого проводили определение уровней антитироглобулина и антитиропероксидазы. Для диагностики АН применяли пробу Вальсальвы и тест «глубокое дыхание». Статистический анализ проводили с помощью стандартной компьютерной программы Microsoft Excel.

Результаты. Состояние автономной иннервации было нормальным у 71,0% обследованных групп гипотиреоза и у 97,8% группы эутиреоза. АН отсутствовала как при синдроме гипотиреоза (0,0%), так и при эутиреоидной патологии ЩЖ (0,0%). При этом «порогичное состояние» автономной иннервации фиксировали у 29,0% обследованных групп синдрома гипотиреоза и лишь у 2,2% обследованных групп эутиреоидной патологии ЩЖ ($p=0,0019$). Шанс выявить парасимпатические нарушения в группе гипотиреоза составил 0,409, а в группе эутиреоидной патологии ЩЖ равнялся 0,022.

Заключение. Таким образом, при наличии гипотиреоза шансы выявить автономные нарушения в 18,409 раза превышали такие же при эутиреоидной патологии ЩЖ, что требует соответствующей коррекции при планировании тактики комплексного лечения.

Ключевые слова: автономная нейропатия, синдром гипотиреоза, эутиреоидная патология щитовидной железы.

Hypothyroidism syndrome as a risk factor for parasympathetic innervation disorders

Aliyeva Gunay Ilham

The objective: to study the significance of the presence of hypothyroidism syndrome as a risk factor for the development of autonomic neuropathy (AN).

Materials and methods. The study involved 77 women, of whom 31 had hypothyroidism syndrome, and 46 had euthyroid thyroid pathology. The age of patients with hypothyroidism syndrome ranged from 24 to 57 years and averaged 42.4 ± 9.20 years, mean age patients of the euthyroid pathology group of the thyroid gland was equal to 40.0 ± 12.22 years (age interval 20–63 years). Patients underwent an ultrasound examination of the thyroid gland, fasting glycemia levels, A1c, TSH, T4s, T3s, blood creatinine levels, and GFR were calculated using CKD-EPI on line equations. In addition, antithyroglobulin and antithyroperoxidase levels were determined. To diagnose autonomic neuropathy, a Valsalva test and a deep breathing test were used. Statistical analysis was performed using the standard computer program Microsoft Excel.

Results. The state of autonomous innervation was normal in 71.0% of the examined hypothyroidism group and in 97.8% of the euthyroidism group. AN was absent both in hypothyroidism syndrome (0.0%) and in euthyroid thyroid pathology (0.0%). Moreover, the “borderline state” of autonomic innervation was observed in 29.0% of the examined groups of hypothyroidism syndrome and only 2.2% of the examined groups of thyroid euthyroid pathology ($p=0.0019$). The chance of finding parasympathetic disorders in the hypothyroidism group was 0.409, and in the group of euthyroid thyroid pathology was 0.022.

Conclusions. Thus, in the presence of hypothyroidism, the chances of finding autonomic disorders were 18.409 times higher than those for euthyroid thyroid pathology, which requires appropriate correction when planning comprehensive treatment tactics.

Key words: autonomic neuropathy, hypothyroidism syndrome, euthyroid pathology of the thyroid gland.

Синдром гіпотиреозу як фактор ризику виникнення порушень парасимпатичної іннервації

Алієва Гюнай Ільхам кызы

Мета дослідження: вивчення синдрому гіпотиреозу як фактора ризику розвитку автономної нейропатії (АН).

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 77 жінок, з яких у 31 діагностованій синдром гіпотиреозу, а у 46 – еутиреоїдна патологія щитоподібної залози (ЩЗ). Вік хворих із синдромом гіпотиреозу коливався у діапазоні від 24 до 57 років і в середньому становив $42,4 \pm 9,20$ року; середній вік хворих групи еутиреоїдної патології ЩЗ дорівнював $40,0 \pm 12,22$ року (віковий інтервал 20–63 року). Хворим проводили ультразвукове обстеження ЩЗ, визначали рівні глікемії натоще, рівень А1с, ТТГ, Т4с, Т3с, вміст креатиніну в крові, а також обчислення СКФ за рівняннями CKD-EPI on line. Крім цього, проводили визначення рівнів антитироглобуліну і антитиропероксидаз. Для діагностики АН застосовували пробу Вальсальви і тест «глибоке дихання». Статистичний аналіз проводили за допомогою стандартної комп’ютерної програми Microsoft Excel.

Результати. Стан автономної іннервациї був нормальним у 71,0% обстежених групи гіпотиреозу й у 97,8% групи еутиреозу. АН була відсутня як при синдромі гіпотиреозу (0,0%), так і при еутиреоїдній патології ЩЗ (0,0%). При цьому «прикордонний стан» автономної іннервациї фіксували у 29,0% обстежених групи синдрому гіпотиреозу і лише у 2,2% обстежених групи еутиреоїдної патології ЩЗ ($p=0,0019$). Шанс виявити парасимпатичні порушення в групі гіпотиреозу становив 0,409, а в групі еутиреоїдної патології ЩЗ – 0,022.

Заключення. Отже, за наявності гіпотиреозу шанси виявити автономні порушення в 18,409 разу перевищували такі при еутиреоїдній патології ЩЗ, що вимагає відповідної корекції під час планування тактики комплексного лікування.

Ключові слова: автономна нейропатія, синдром гіпотиреозу, еутиреоїдна патологія щитоподібної залози.

Автономная нейропатия (АН), характеризующаяся поражением иннервации внутренних органов, может развиваться при множестве заболеваний, включая аутоиммунную и генетическую патологию [1], однако главной причиной ее развития является сахарный диабет (СД) [2]. АН описана при заболеваниях, характеризующихся функциональной патологией со стороны щитовидной железы (ЩЖ) [1]. Однако если автономной диабетической нейропатии во всем мире посвящены сотни и даже тысячи исследований, то изучению нарушений автономной иннервации при патологии ЩЖ посвящены лишь несколько десятков работ.

Цель исследования: изучение синдрома гипотиреоза как фактора риска развития АН.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 77 женщин, из которых у 31 диагностирован синдром гипотиреоза и у 46 выявлена эутиреоидная патология ЩЖ.

Возраст больных с синдромом гипотиреоза находился в диапазоне от 24 до 57 лет и в среднем был равен $42,4 \pm 9,20$ года. Минимальный возраст больных группы эутиреоидной патологии ЩЖ был равен 20 годам, а максимальный – 63 годам. При этом средний возраст больных этой группы соответствовал $40,0 \pm 12,22$ года и статистически значимо не отличался ($p > 0,05$) от возраста больных группы гипотиреоза.

Критериями включения в исследование были:

- женский пол;
- возраст 18–65 лет;
- наличие манифестного или субклинического синдрома гипотиреоза (нелеченного или неадекватно леченного) или наличие заболеваний ЩЖ в состоянии эутиреоза.

Критериями исключения из исследования были:

- возраст старше 65 лет;
- наличие характерных для СД или предиабета показателей ($A1c \geq 5,7\%$, гликемия натощак 100 мг/дл и выше) [6,7];
- наличие серьезной патологии со стороны сердечно-сосудистой или дыхательной системы, ограничивающей возможность проведения проб на функциональное состояние автономной нервной системы;
- прием β -блокаторов;
- уровень СКФ менее 60 ml/min/1,73 m²;
- отсутствие данных, позволяющих идентифицировать соответствие критериям включения в исследование и критериям исключения из него: гликогемоглобина ($A1c$); гликемии натощак; тиреотропного гормона (ТТГ); свободного тироксина (T4c); свободного трийодтиронина (T3c); антитироглобулина (анти-ТГ) и антитирокпероксидазы (анти-ТПО); ультразвукового исследования ЩЖ.

Ультразвуковое обследование ЩЖ проводили на аппарате «SonoScape» производства SonoScape Ltd (Китай) и Sonomed (Италия). Уровни гликемии натощак определяли с помощью аппарата для лабораторного исследования гликемии Precision PCx Medi Sense (Abbott, США) и соответствующих тест-полосок. Уровень $A1c$ определяли на экспресс-анализаторе «SDA1c Care» (SD biosensor, Korea) с помощью соответствующих «test kit». Величины уровня креатинина в крови определяли на экспресс-анализаторе «Reflotron Plus»

Данные по шансу выявить парасимпатические нарушения в группе гипотиреоза и в группе эутиреоидной патологии ЩЖ

Показатель	Величина
Шанс выявить парасимпатические нарушения в группе гипотиреоза	0,409
Шанс выявить парасимпатические нарушения в группе эутиреоидной патологии ЩЖ	0,022
Отношение шансов (OR)	18,409
Стандартная ошибка отношения шансов (S)	1,086
Нижняя граница 95% доверительного интервала (CI)	2,192
Верхняя граница 95% доверительного интервала (CI)	154,602

(Roche Diagnostics Corporation, Швейцария) с помощью соответствующих «test strip». Проводили также вычисление СКФ по уравнениям CKD-EPI on line [13]. Уровни ТТГ, Т4с, Т3с определяли на экспресс-анализаторе «SelexOn» производства «Infopia Co. Ltd», Корея. Уровни анти-ТГ и анти-ТПО определяли на аппарате BioScreen MS-500 с помощью реактивов компании «Human» (Германия).

В связи с тем, что «VM Центр Эндокринологии, Диабета и Метаболизма» – это частное медицинское учреждение, основным лимитирующим фактором являлось наличие у больного финансовой возможности полностью пройти соответствующее обследование.

Для диагностики АН применяли пробу Вальсальвы и тест «глубокое дыхание». Результаты пробы Вальсальвы оценивали по индексу Вальсальвы; результаты теста «глубокое дыхание» оценивали по двум показателям: индексу «Expiratio/Inspiratio» (E/I) и индексу «Inspiratio-Expiratio» (I-E) [2, 5–7]. Для интерпретации величин каждого из трех означенных индексов применяли соответствующие критерии, предложенные D.J. Ewing et al. [5] и В.А. Мирзазаде [6]. При оценке величин индексов было возможно наличие трех типов ответов: «норма»; «пограничное состояние»; «АДН».

Ниже представлены данные о балльной оценке получаемых результатов, которые легли в основу проводившегося исследования:

- 1) «Норма» – 0 баллов;
- 2) «Пограничное состояние» – 1 диагностический балл;
- 3) «АН» – 2 диагностических балла.

В связи с тем, что по результатам пробы Вальсальвы каждый больной мог получить лишь две оценки, а по результатам теста «глубокое дыхание» каждый больной мог получить четыре оценки, для уравнивания «веса» каждого теста количество баллов, набранных по результатам пробы Вальсальвы, умножали на 2. Предположим, что больной в сумме набрал 2 балла по результатам пробы Вальсальвы и 4 балла по результатам теста «глубокое дыхание». Общая суммарная оценка результатов этого больного будет: $2 \times 2 + 4 = 8$ (диагностических баллов).

Статистический анализ проводили с помощью стандартной компьютерной программы Microsoft Excel [8]. Данные по группам представлены в виде средней величины (M) \pm стандартное отклонение (SD). Статистическую значимость различий между долями определяли с помощью метода χ^2 on line [8]. Применена методика определения шансов и отношения шансов (odds ratio) [9,10]. Вычисление расчета шансов с 95% доверительным интервалом проводили on line. [12]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Из 31 больного с синдромом гипотиреоза у 5 (16,1%) больных диагностирован постоперационный гипотиреоз, у 24 (77,4%) – гипотиреоз, развившийся в результате аутоиммунного тиреоидита, у 2 (6,5%) больных – ятрогенный гипотиреоз, обусловленный избыточной терапией по поводу токсического зоба.

В группе эутиреоидной патологии ЩЖ (n=46) у 1 (2,2%) больной выявлен диффузный токсический зоб в состоянии

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

эутиреоза, у 7 (15,2%) больных – адекватно контролируемый гипотиреоз, у 38 (82,6%) больных – аутоиммунный тиреоидит в состоянии эутиреоза.

Состояние автономной иннервации было нормальным у 71,0% обследованных группы гипотиреоза и у 97,8% – группы эутиреоза. АН отсутствовала как при синдроме гипотиреоза (0,0%), так и при эутиреоидной патологии ЩЖ (0,0%). При этом «пограничное состояние» автономной иннервациификсировали у 29,0% обследованных группы синдрома гипотиреоза и лишь у 2,2% обследованных группы эутиреоидной патологии ЩЖ ($p=0,0019$).

Как видно из таблицы, шанс выявить парасимпатические нарушения в группе гипотиреоза составил 0,409. Шанс выявить парасимпатические нарушения в группе эутиреоидной патологии ЩЖ равнялся 0,022.

Таким образом, при наличии гипотиреоза шансы выявить автономные нарушения в 18,409 раза превышали таковые при эутиреоидной патологии ЩЖ. Полученные данные были статистически значимы ($p<0,05$).

ВЫВОДЫ

1. Нарушения автономной иннервации выявлены в 29,0% случаев в группе гипотиреоза и лишь в 2,2% случаев в группе эутиреоидной патологии ЩЖ.
2. Как в группе гипотиреоза, так и в группе эутиреоза не было выявлено грубых нарушений автономной иннервации.
3. При наличии гипотиреоза шансы выявить автономные нарушения в 18,409 раза превышали таковые при эутиреоидной патологии ЩЖ. Полученные данные были статистически значимы ($p<0,05$).

Сведения об авторе

Алиева Гюнай Ильхам кызы – Азербайджанский медицинский университет, AZ1022, г. Баку, ул. Бакиханова, 23; тел.: (+99412) 597-36-95

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Əliyeva G.I. Avtonom neyropatiya. Azərbaycan Metabolizm Jurnalı, 2018, c.15, №1, s.46-47.
2. Əliyeva G.I., Qurbanov Y.Z., Mirzəzadə V.A., Novruzova M.S. Avtonom diabetik neyropatiyanın diaqnostikası. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyyətləri, 2017, N4,s.17-23.
3. Azərbaycan Respublikasə Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevnik Təlimat assosiasiyası./ Şəkərli diabetin diaqnostikası, profilaktikası və tibbi yardım üzrə standartları./Bakə, 2017, "Azərdiab" nəşriyatə, 134 s.
4. American Diabetes Assosiation. Standards of Medical Care in Diabetes – 2019.// Diabetes Care, 2019, v.42, Suppl. 1, p.S1-S193.
5. Ewing D.J., Martyn C.N., Young R.J., Clarke B.F. The value of cardiovascular function tests: 10 years experience in diabetes. Diabetes Care, 1985, v.8, p.491– 498.
6. Мирзааде В.А. Автономная диабетическая нейропатия (патогенез, клиника, диагностика, лечение): Дисс. ... д.м.н. – Баку, 1991. – 341 с.
7. Vinik A.I., Ziegler D. Diabetic Cardiovascular Autonomic Neuropathy. Circulation, 2007, v.115, p.387-397
8. Excel 2016 – get it now with an Office 365 subscription. <https://products.office.com/en-us/excel>
9. MEDCALC easy-to-use statistical software. https://www.medcalc.org/calc/comparison_of_proportions.php
10. Boston University School of Public Health. B. Confidence Intervals for the Risk Ratio (Relative Risk). Boston University School of Public. Date last modified: October 27, 2017. http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt MPH-Modules/BS/BS704_Confidence_Interval/BS704_Confidence_Interval8.html
11. Красько О. Статистический анализ данных в медицинских исследованиях. Учебно-методическое пособие. – Минск, 2014. – 126 с
12. Медицинская статистика. <http://medstatistic.ru/calculators/calcodds.html>
13. MDCALC. CKD-EPI Equations for Glomerular Filtration Rate (GFR). <https://www.mdcalc.com/ckd-epi-equations-glomerular-filtration-rate-gfr>

Статья поступила в редакцию 27.12.2019

UDC: 616.1: 616.44

Hypothyroidism syndrome as a risk factor for parasympathetic innervation disorders

Aliyeva Gunay Ilham

Azerbaijan Medical University

The objective: to study the significance of the presence of hypothyroidism syndrome as a risk factor for the development of autonomic neuropathy (AN).

Materials and methods. The study involved 77 women, of whom 31 had hypothyroidism syndrome, and 46 had euthyroid thyroid pathology. The age of patients with hypothyroidism syndrome ranged from 24 to 57 years and averaged 42.4 ± 9.20 years, mean age patients of the euthyroid pathology group of the thyroid gland was equal to 40.0 ± 12.22 years (age interval 20–63 years). Patients underwent an ultrasound examination of the thyroid gland, fasting glycemia levels, A1c, TSH, T4s, T3s, blood creatinine levels, and GFR were calculated using CKD-EPI on line equations. In addition, antithyroglobulin and antithyroperoxidase levels were determined. To diagnose autonomic neuropathy, a Valsalva test and a deep breathing test were used. Statistical analysis was performed using the standard computer program Microsoft Excel.

Results. The state of autonomous innervation was normal in 71.0% of the examined hypothyroidism group and in 97.8% of the euthyroidism group. AN was absent both in hypothyroidism syndrome (0.0%) and in euthyroid thyroid pathology (0.0%). Moreover, the “borderline state” of autonomic innervation was observed in 29.0% of the examined groups of hypothyroidism syndrome and only 2.2% of the examined groups of thyroid euthyroid pathology ($p=0.0019$). The chance of finding parasympathetic disorders in the hypothyroidism group was 0.409, and in the group of euthyroid thyroid pathology was 0.022.

Conclusions. Thus, in the presence of hypothyroidism, the chances of finding autonomic disorders were 18.409 times higher than those for euthyroid thyroid pathology, which requires appropriate correction when planning comprehensive treatment tactics.

Key words: autonomic neuropathy, hypothyroidism syndrome, euthyroid pathology of the thyroid gland.

Синдром гіпотиреозу як фактор ризику виникнення порушень парасимпатичної іннервації

Алієва Гюнаї Ільхам кызы

Мета дослідження: вивчення синдрому гіпотиреозу як фактора ризику розвитку автономної нейропатії (АН).

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 77 жінок, з яких у 31 діагностованій синдром гіпотиреозу, а у 46 – єутиреоїдна патологія щитоподібної залози (ЩЗ). Вік хворих із синдромом гіпотиреозу коливався у діапазоні від 24 до 57 років і в середньому становив 42.4 ± 9.20 року; середній вік хворих групи єутиреоїдної патології ЩЗ дорівнював 40.0 ± 12.22 року (віковий інтервал 20–63 року). Хворим проводили ультразвукове обстеження ЩЗ, визначали рівні глікемії натощак, рівень А1с, ТТГ, Т4с, Т3с, вміст креатиніну в крові, а також обчислення СКФ за рівняннями CKD-EPI on line. Крім цього, проводили визначення рівнів антитироглобуліну і антитиропероксидази. Для діагностики АН застосовували пробу Вальсальви і тест «глибоке дихання». Статистичний аналіз проводили за допомогою стандартної комп’ютерної програми Microsoft Excel.

Результатами. Стан автономної іннервації був нормальним у 71,0% обстежених групи гіпотиреозу й у 97,8% групи єутиреоуз. АН була відсутня як при синдромі гіпотиреозу (0,0%), так і при єутиреоїдній патології ЩЗ (0,0%). При цьому «прикордонний стан» автономної іннервації фіксували у 29,0% обстежених групи синдрому гіпотиреозу і лише у 2,2% обстежених групи єутиреоїдної патології ЩЗ ($p=0,0019$). Шанс виявити парасимпатичні порушення в групі гіпотиреозу становив 0,409, а в групі єутиреоїдної патології ЩЗ – 0,022.

Заключення. Отже, за наявності гіпотиреозу шанси виявити автономні порушення в 18,409 разу перевищували такі при єутиреоїдній патології ЩЗ, що вимагає відповідної корекції під час планування тактики комплексного лікування.

Ключові слова: автономна нейропатія, синдром гіпотиреозу, єутиреоїдна патологія щитоподібної залози.

Синдром гипотиреоза как фактор риска возникновения нарушений парасимпатической иннервации

Алиева Гюнаї Ильхам кызы

Цель исследования: изучение синдрома гипотиреоза как фактора риска развития автономной нейропатии (АН).

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 77 женщин, из которых у 31 диагностирован синдром гипотиреоза, а у 46 – єутиреоидная патология щитовидной железы (ЩЖ). Возраст больных с синдромом гипотиреоза находился в диапазоне от 24 до 57 лет и в среднем был равен 42.4 ± 9.20 года; средний возраст больных группы єутиреоидной патологии ЩЖ был равен 40.0 ± 12.22 года (возрастной интервал 20–63 года). Больным проводили ультразвуковое обследование ЩЖ, определяли уровни гликемии натощак, уровень А1с, ТТГ, Т4с, Т3с, содержание креатинина в крови, а также вычисление СКФ по уравнениям CKD-EPI on line. Помимо этого проводили определение уровней антитироглобулина и антитиропероксидазы. Для диагностики АН применяли пробу Вальсальвы и тест «глубокое дыхание». Статистический анализ проводили с помощью стандартной компьютерной программы Microsoft Excel.

Результаты. Состояние автономной иннервации было нормальным у 71,0% обследованных групп гипотиреоза и у 97,8% группы єутиреоуз. АН отсутствовала как при синдроме гипотиреоза (0,0%), так и при єутиреоидной патологии ЩЖ (0,0%). При этом «пограничное состояние» автономной иннервации фиксировали у 29,0% обследованных групп синдрома гипотиреоза и лишь у 2,2% обследованных групп єутиреоидной патологии ЩЖ ($p=0,0019$). Шанс выявить парасимпатические нарушения в группе гипотиреоза составил 0,409, а в группе єутиреоидной патологии ЩЖ равнялся 0,022.

Заключение. Таким образом, при наличии гипотиреоза шансы выявить автономные нарушения в 18,409 раза превышали такие при єутиреоидной патологии ЩЖ, что требует соответствующей коррекции при планировании тактики комплексного лечения.

Ключевые слова: автономная нейропатия, синдром гипотиреоза, єутиреоидная патология щитоподібної залози.

Autonomic neuropathy (AN), characterized by damage to the innervation of internal organs, can develop with many diseases, including autoimmune and genetic pathology [1], but diabetes is the main reason for its development [2]. AN is described in diseases characterized by functional pathology of the thyroid gland (thyroid gland) [1], however, while hundreds and even thousands of studies have been devoted to autonomic diabetic neuropathy to the whole world, only a few dozen works have been devoted to the study of autonomic innervation disorders in thyroid pathology.

The objective: to study the significance of the presence of hypothyroidism syndrome as a risk factor for the development of autonomic neuropathy.

MATERIALS AND METHODS

The study involved 77 women, of whom 31 had hypothyroidism syndrome and 46 had thyroid euthyroid pathology.

The age of patients with hypothyroidism syndrome ranged from 24 to 57 years and averaged 42.4 ± 9.20 years. The minimum age of patients with a euthyroid thyroid pathology group was 20 years, and the maximum was 63 years. Moreover, the average age of patients in this group corresponded to 40.0 ± 12.22 years and did not statistically significantly differ ($p > 0.05$) from the age of patients in the hypothyroidism group.

The criteria for inclusion in the study were:

- the presence of a female;
- age 18–65 years;
- the presence of manifest or subclinical hypothyroidism syndrome (untreated or inadequately treated) or the presence of thyroid diseases in a state of euthyroidism.

Exclusion criteria from the study were:

- age over 65 years;
- the presence of diabetes mellitus or prediabetes (A1c $\geq 5.7\%$, fasting glycemia of 100 mg/dl and higher) [6,7];
- the presence of a serious pathology on the part of the cardiovascular or respiratory system, limiting the possibility of conducting tests on the functional state of the autonomic nervous system;
- reception of b-blockers;
- GFR level less than 60 ml / sec / 1.73 m^2 ;
- lack of data to identify compliance with the inclusion criteria in the study and the exclusion criteria from it: glycohemoglobin (A1c); fasting glycemia; thyroid stimulating hormone (TSH); free thyroxine (T4c); free triiodothyronine (T3c); antithyroglobulin (anti-TG) and antithyroperoxidase (anti-TPO); ultrasound examination of the thyroid gland;

An ultrasound examination of the thyroid gland was performed on a SonoScape apparatus manufactured by SonoScape Ltd (China) and Sonomed (Italy). Fasting glycemia levels were determined using a Precision PCx Medi Sense laboratory glycemic test apparatus (Abbot, USA) and corresponding test strips. A1c level was determined on an express analyzer («SDA1c Care» (SD biosensor, Korea) using the appropriate «test kit». Blood creatinine values were determined on a Reflotron Plus express analyzer (Roche Diagnostics Corporation, Switzerland) using the corresponding «test strip.» GFR was also calculated using the CKD-EPI on line equations [13] The levels of TSH, T4c, and T3c were determined on a SelexOn express analyzer manufactured by Infopia Co. Ltd, Korea.

The levels of antithyroglobulin and antithyroperoxidase were determined on a BioScreen MS-500 apparatus using reagents of the Human company (Germany).

Due to the fact that the «VM Center of Endocrinology, Diabetes and Metabolism» was a private medical institution, the main limiting factor was the patient's financial ability to fully undergo an appropriate examination.

To diagnose autonomic neuropathy, a Valsalva test and a deep breathing test were used. The results of the Valsalva test

were evaluated by the Valsalva index, the results of the deep breath test were evaluated by two indicators: the Expiratio / Inspiratio index (E/I) and the Inspiratio - Expiratio index (I-E) [2, 5–7] To interpret the values of each of the three indicated indices, the corresponding criteria proposed by Ewing D.J [5] and Mirzazade V.A. were used [6]. When evaluating the values of indices, it was possible to have 3 types of answers: «norm»; «Border state»; «ADN».

Below is the data on the scoring of the results that formed the basis of the study:

- 1) «Norm» – 0 points;
- 2) «Borderline condition» – 1 diagnostic point;
- 3) «AN» – 2 diagnostic points.

Due to the fact that according to the results of the Valsalva test, each patient could receive only 2 ratings, and according to the results of the «deep breathing» test, each patient could receive 4 ratings, to equalize the «weight» of each test, the number of points scored according to the results of the Valsalva test was multiplied by 2. Assume that the patient in total scored 2 points according to the results of Valsalva's test and 4 points according to the results of the «deep breathing» test. The total assessment of the results of this patient will be: $2 + 4 = 8$ (diagnostic points).

Statistical analysis was performed using the standard computer program Microsoft Excel [8]. Group data are presented as mean (M) \pm standard deviation (SD). The statistical significance of differences between the fractions was determined using the t on line method [8]. A methodology for determining odds and odds ratio has been applied [9, 10]. The odds calculation with a 95% confidence interval was calculated on line [12].

RESULTS AND ITS DISCUSSION

Of 31 patients with hypothyroidism syndrome, 5 patients (16.1%) had postoperative hypothyroidism, 24 (77.4%) had hypothyroidism that developed as a result of autoimmune thyroiditis, 2 patients (6.5%) had iatrogenic hypothyroidism due to excessive therapy for toxic goiter .

In the euthyroid thyroid pathology group ($n=46$), 1 patient (2.2%) had diffuse toxic goiter in the state of euthyroidism, 7 (15.2%) patients had adequately controlled hypothyroidism, 38 patients (82.6%) had autoimmune thyroiditis in state of euthyroidism.

The state of autonomous innervation was normal in 71.0% of the examined hypothyroidism group and in 97.8% of the euthyroidism group. AN was absent both in hypothyroidism syndrome (0.0%) and in euthyroid thyroid pathology (0.0%). Moreover, the «borderline state» of autonomic innervation was observed in 29.0% of the examined groups of hypothyroidism syndrome and only 2.2% of the examined groups of thyroid euthyroid pathology ($p=0.0019$).

As can be seen from table 1, the chance to find parasympathetic disorders in the hypothyroidism group was 0.409. The

Data on the chance of finding parasympathetic disorders in the group of hypothyroidism and in the group of euthyroid thyroid pathology

Indicator	Value
The chance to find parasympathetic disorders in the hypothyroidism group	0.409
The chance to find parasympathetic disorders in the euthyroid thyroid pathology group	0.022
The odds ratio (OR)	18.409
The odds ratio standard error (S)	1.086
The lower bound is 95% confidence interval (CI)	2.192
The upper limit of the 95% confidence interval (CI)	154.602

chance of finding parasympathetic disorders in the euthyroid thyroid pathology group was 0.022.

Thus, in the presence of hypothyroidism, the chances of finding autonomous disorders were 18.409 times higher than those for euthyroid thyroid pathology. The data obtained were statistically significant ($p<0.05$).

CONCLUSIONS

- Autonomic innervation disorders were detected in

29.0% of cases in the hypothyroidism group and only 2.2% of cases in the thyroid euthyroid pathology group.

2. Both in the hypothyroidism group and in the euthyroidism group, no gross violations of autonomic innervation were detected.

3. In the presence of hypothyroidism, the chances of finding autonomous disorders were 18.409 times higher than those for euthyroid thyroid pathology. The data obtained were statistically significant ($p<0.05$).

Сведения об авторе

Алиева Гюнай Ильхам кызы – Азербайджанский медицинский университет, AZ1022, г. Баку, ул. Бакиханова, 23; тел.: (+99412) 597-36-95

LITERATURE

- Əliyeva G.İ. Avtonom neyropatiya. Azərbaycan Metabolizm Jurnalı, 2018, c.15, №1, s.46-47.
- Əliyeva G.İ., Qurbanov Y.Z., Mirzəzadə V.A., Novruzova M.S. Avtonom diabetik neyropatiyanın diaqnostikası. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyyətləri, 2017, N4, s.17-23.
- Azərbaycan Respublikasə Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevnik Təlimat assosiasiyyası./ Şəkərli diabetin diaqnostikası, profilaktikası və tibbi yardım üzrə standartları./Bakə, 2017, "Azərdiab" nəşriyatı, 134 s.
- American Diabetes Assosiation. Standards of Medical Care in Diabetes – 2019.// Diabetes Care, 2019, v.42, Suppl. 1, p.S1-S193.
- Ewing D.J., Martyn C.N., Young R.J., Clarke B.F. The value of cardiovascular function tests: 10 years experience in diabetes. Diabetes Care, 1985, v.8, p.491–498.
- Мирзазаде В.А. Автономная диабетическая нейропатия (патогенез, клиника, диагностика, лечение): Дисс. ... д.м.н. – Баку, 1991. – 341 с.
- Vinik A.I., Ziegler D. Diabetic Cardiovascular Autonomic Neuropathy. Circulation, 2007, v.115, p.387-397
- Excel 2016 – get it now with an Office 365 subscription. <https://products.office.com/en-us/excel>
- MEDCALC easy-to-use statistical software. https://www.medcalc.org/calc/comparison_of_proportions.php
- Boston University School of Public Health. B. Confidence Intervals for the Risk Ratio (Relative Risk). Boston University School of Public. Date last modified: October 27, 2017. http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt MPH-Modules/BS/BS704_Confidence_Interval s/BS704_Confidence_Interval s8.html
- Красько О. Статистический анализ данных в медицинских исследованиях. Учебно-методическое пособие. – Минск, 2014. – 126 с
- Медицинская статистика. <http://medstatistic.ru/calculators/calcodds.html>
- MDCALC. CKD-EPI Equations for Glomerular Filtration Rate (GFR). <https://www.mdcalc.com/ckd-epi-equations-glomerular-filtration-rate-gfr>

Статья поступила в редакцию 27.12.2019