

# УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ»

Науково-практичний журнал

## UKRAINIAN JOURNAL «HEALTH OF WOMAN»

Scientific and Practical journal

4(173)/2024

### ЗМІСТ

#### ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

- Потапов В.О., Гарагуля І.С.  
**Результати оцінювання клінічної і молекулярно-гістологічної ефективності лікарського засобу ПРОТЕФЛАЗІД® у лікуванні папіломавірусної інфекції в жінок із цервікальною інтраепітеліальною неоплазією**
- Диндар О.А., Димарська О.З.  
**Оцінювання рівня ендогенної інтоксикації в жінок репродуктивного віку після оперативного лікування ендометріом**
- Зарічанська Х.В.  
**Чутливість і специфічність діагностичного комплексу в жінок з інтраепітеліальним ураженням шийки матки**
- Леуш С.Ст., Говсьєєв Д.О., Загородня О.С.  
**Безпечність токолітичної терапії в різних гестаційних термінах**
- Бенюк В.О., Чеботарьова А.С., Гичка Н.М., Бенюк С.В.  
**Роль інфекції уrogenітального тракту при замерлій вагітності в пізньому терміні**
- Запопадна Ю.М.  
**Особливості психічного стану вагітних із HCV-інфекцією**
- Поладич І.В., Говсьєєв Д.О.  
**Особливості вітаміну D статусу у вагітних**
- Кінаш Н.М., Левицький І.В., Кравчук І.В., Мартинюк Д.С.  
**Оцінювання ефективності фізичних вправ для ліквідації діастазу прямих м'язів живота в жінок у постпартумі**
- Скрипниченко І.Д., Тихончук Н.А.  
**Особливості хвороби сухого ока в жінок із клімактеричним синдромом**
- Лісецька І.С., Дівнич Т.Я.  
**Проблема поширеності шкідливої звички паління серед дівчат юнацького віку**

#### ОГЛЯДИ

- Дубоссарська Ю.О., Бондаренко Л.А.  
**Тактика ведення вагітності дихоріальною діамніотичною двійнею, ускладненою внутрішньоутробною загибеллю одного з плодів (огляд літератури)**

#### КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

- Шемякіна Н.М., Суліменко Є.М., Суліменко О.М., Коваленко М.М.  
**Розродження при аномальній інвазії плаценти: placenta accreta spectrum**

### CONTENT

#### ORIGINAL ARTICLES

- 4 Potapov V.O., Garagulia I.S.  
**Results of the clinical and molecular-histological assessment of the effectiveness of the drug PROTEFLAZID® in the treatment of papillomavirus infection in women with cervical intraepithelial neoplasia**
- 15 Dyndar O.A., Dymarska O.Z.  
**Women of reproductive age endogenous intoxication level assessment after surgical treatment of endometriosis**
- 21 Zarichanska Kh.V.  
**Diagnostic sensitivity and specificity complex in women with intraepithelial lesions of the cervix utery**
- 26 Leush S.S., Govsiev D.O., Zahorodnia O.S.  
**Tocolytic therapy safeness in various gestational terms**
- 33 Beniuk V.O., Chebotarova A.S., Hychka N.M., Beniuk S.V.  
**Urinary infections and perinatal losses**
- 40 Zapopadna Y.M.  
**Peculiarities of the psychological state of pregnant women with HCV infection**
- 46 Poladich I.V., Govsiev D.O.  
**Peculiarity of vitamin D status in pregnant women**
- 52 Kinash N.M., Levytskyi I.V., Kravchuk I.V., Martyniuk D.S.  
**Evaluation of the efficiency of physical exercises for the elimination of diastasis of the rectus abdominal muscles in postpartum women**
- 56 Skrypnychenko I.D., Tykhonchuk N.A.  
**Features of dry eye disease in women with menopausal syndrome**
- 62 Lisetska I.S., Divnych T.Y.  
**The problem of the prevalence of smoking habit among adolescent girls**

#### REVIEWS

- 68 Dubossarska Yu.O., Bondarenko L.A.  
**Management of pregnancy with dichorionic diamniotic twins complicated by intrauterine death of one of the fetuses (literature review)**

#### CLINICAL CASE

- 75 Shemyakina N.M., Sulimenko Y.M., Sulimenko O.M., Kovalenko M.M.  
**Birth with abnormal placenta invasion: placenta accreta spectrum**

# ПРОТЕФЛАЗІД®

## ЕТІОТРОПНА ТЕРАПІЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ

### Рекомендоване одночасне застосування

ПРОТЕФЛАЗІД® краплі та ПРОТЕФЛАЗІД® супозиторії<sup>1</sup>



- ✓ папіломавірусна інфекція
- ✓ генітальний герпес
- ✓ інфекції змішаної етіології<sup>1</sup>

#### ПРОТЕФЛАЗІД® краплі

Інформація на підставі інструкції для медичного застосування лікарського засобу Протефлазід® краплі (зі змінами у відповідності до Наказу МОЗ України №2131 від 25.11.2022)

**Склад:** 1 мл крапель містить 1 мл рідкого екстракту Протефлазід (вміст флавоноїдів не менше 0,32 мг/мл у перерахунку на рутин, вміст карбонових кислот не менше 0,30 мг/мл у перерахунку на яблучну кислоту) із трави Щучки дернистої (*Herba Deschampsia caespitosa* L.) та трави Війника наземного (*Herba Calamagrostis epigeios* L.) (1:1). Розчинник екстракції: етанол 96%. **Фармакотерапевтична група.** Протівірусні засоби прямої дії. Код АТХ J05A X. **Фармакологічні властивості.** Флавоноїди, які входять до складу препарату, пригнічують реплікацію ДНК- та РНК-вірусів як *in vitro*, так і *in vivo*. Доведено, що механізм прямої протівірусної дії полягає в інгібуванні вірусоспецифічних ферментів – ДНК- та РНК-полімерази, тимідинкінази, зворотної транскриптази, 3СL протеази та нейрамінідази. Препарат має імуномодуляторні властивості. Захищає слизові оболонки, нормалізує показники місцевого імунітету (лактоферин, секреторний імуноглобулін А, лізоцим та С<sub>3</sub> компонент комплекменту). Препарат є індуктором синтезу ендогенних α- та γ-інтерферонів до фізіологічно активного рівня. Клінічні дослідження показали, що за умови щоденного прийому, згідно з віковими дозами та схемами застосування, препарат не чинить імуноотоксичної дії та не викликає рефрактерності (гіперактивності) імунної системи; не спостерігається пригнічення синтезу альфа- та гамма-інтерферонів, що дає можливість застосовувати препарат протягом тривалого часу. Препарат є модулятором апоптозу, підсилює дію апоптозіндуруючих речовин та активує каспазу 9, чим сприяє елімінації уражених вірусом клітин та первинній профілактиці виникнення хронічних захворювань на фоні латентних вірусних інфекцій. **Показання.** Етіотропна терапія легких та середніх форм дисплазії шийки матки (СН1 та СН2), спричиненої папіломавірусною інфекцією, в тому числі онкогенними штабами. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату. Виразка шлунку або дванадцятипалої кишки. **Побічні реакції.** В осіб із підвищеною чутливістю, можуть мати місце реакції гіперчутливості. Рідко алергічні реакції, включаючи еритематозні висипання, свербіж. Поодинокі випадки шлунково-кишкових розладів – біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання, діарея. У пацієнтів з хронічним гастроудуоденітом можливе загострення, виникнення гастроєзофагеального рефлюксу (рефлюкс-езофагіт). У поодиноких випадках головний біль, загальна слабкість, транзиторне підвищення температури тіла до 38 °С на 3-10-й день терапії препаратом. При вірусних гепатитах у 10-15% хворих із вираженим цитолітичним синдромом спостерігається підвищення активності амінотрансфераз (рідше – рівня білірубину). **Категорія відпуску.** За рецептом. **Виробник.** ТОВ «НВК «Екофарм».

#### ПРОТЕФЛАЗІД® супозиторії

Інформація на підставі інструкції для медичного застосування лікарського засобу Протефлазід® супозиторії (зі змінами у відповідності до Наказу МОЗ України №2271 від 15.12.2022)

**Склад.** Діюча речовина: 1 супозиторій містить флавоноїди Протефлазиду, одержані із суміші (1:1) трави Щучки дернистої (*Herba Deschampsia caespitosa* L.) та трави Війника наземного (*Herba Calamagrostis epigeios* L.), не менше 1,8 мг; допоміжні речовини: бутилгідроксіанізол (Е 320), поліетиленгліколь-400, поліетиленгліколь-1500, поліетиленгліколь-4000, до одержання маси 3 г. **Фармакотерапевтична група.** Протівірусні засоби прямої дії. Код АТХ J05A X. Інші гінекологічні засоби. Код АТХ G02 C X. **Фармакологічні властивості.** Інгібує синтез ДНК- та РНК-вірусів завдяки пригніченню активності вірусоспецифічних ферментів РНК- та ДНК-полімерази, тимідинкінази та зворотної транскриптази, має імуномодуляторні властивості. Сприяє синтезу ендогенних α- та γ-інтерферонів до фізіологічно активного рівня (без виникнення явища рефрактерності); відновлює захисну функцію слизової оболонки піхви та шийки матки завдяки нормалізації факторів місцевого імунітету (IgA, лізоцим та С<sub>3</sub> компонент комплекменту). У досліджах на експериментальних моделях онкогенних вірусів папіломи людини *in vitro* показано, що діюча речовина лікарського засобу має специфічну антивірусну активність та інгібує репродукцію ВПЛ на 2 Ig ID<sub>50</sub>. Пригнічує проліферативну та деструктивну дію ВПЛ на клітині. При лікуванні дисплазії епітелію шийки матки, що зумовлена ПВІ, відзначається нормалізація цитологічної картини або перехід цервікальної інтраепітеліальної неоплазії класу СІН-II (дисплазія середнього ступеня) до класу СІН-I (дисплазія слабого ступеня). Препарат є модулятором апоптозу. **Показання.** Лікування захворювань жіночих статевих органів, спричинених вірусами папіломи людини (ВПЛ), включаючи онкогенні штами. **Протипоказання.** Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату. **Особливості застосування.** Етіотропну терапію захворювань, зазначених у розділі «Показання», крім місцевої терапії препаратом ПРОТЕФЛАЗІД® (супозиторії), необхідно доповнити пероральним застосуванням препарату ПРОТЕФЛАЗІД® (краплі) за схемою та у дозах, вказаних у відповідній інструкції. **Побічні реакції.** Можливий незначний місцевий свербіж або печія слизової оболонки, які зникають самостійно та не потребують відміни препарату. Можливі реакції гіперчутливості, алергічні реакції. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Виробник.** ТОВ «НВК «Екофарм».

**Посилання:** 1. Інструкції для медичного застосування препаратів Протефлазід® краплі та Протефлазід® супозиторії.

За детальною інформацією звертайтеся до інструкцій для медичного застосування препаратів Протефлазід® краплі та Протефлазід® супозиторії.

Інформація про лікарські засоби для використання у професійній діяльності працівниками медичної та фармацевтичної галузей та розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозиумах та ін. заходах з медичної тематики. Реєстраційне посвідчення ПРОТЕФЛАЗІД® краплі №UA/4220/01/01, термін дії необмежений. Реєстраційне посвідчення ПРОТЕФЛАЗІД® супозиторії UA/4220/02/01, термін дії необмежений.



ТОВ «Науково-виробнича компанія «Екофарм».

Україна, 03045, м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, 136-Б.

Тел/факс: (044) 594-05-99 office@ecopharm.ua

www.ecopharm.ua